

Система за производство на рапица Clearfield® Инструкции за употреба и стопанисване на BASF

ПРЕДИ ДА СЕ ОТВОРИ ТОРБИЧКАТА СЪС СЕМЕНАТА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПРОЧЕТАТ ИЗЦЯЛО СЛЕДНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА И СТОПАНИСВАНЕ И ДА ГИ СПАЗВАТ ПРЕДИ СЕИТБА

Общи положения

- 1) Система за производство на рапица Clearfield. Използвайте рапичните хербициди **Clearfield** само за сортовете рапица на **Clearfield**.
- 2) Съблюдаване
 - Добрата селскостопанска практика: Спазвайте винаги правилата на местната Добра селскостопанска практика. Използвайте навсякъде и когато това е възможно интегрирана техника за унищожаване на плевелите като контролирате тяхната поява преди да засеете рапицата на **Clearfield**.
 - Приложимо право: Спазвайте винаги валидното законодателство и съблюдавайте инструкциите на етикета на съответния хербицид, за да постигнете възможно най-добри резултати при унищожаване на плевелите.

Предотвратяване на щети по посева

- 1) Предотвратяване на неправилно приложение Обърнете внимание на това, че семената **Clearfield** и хербицидите **Clearfield** носят винаги търговската марка на **Clearfield**. След името на съответния сорт рапица на **Clearfield** се намира винаги наставката „CL“.
- 2) Използване на хербициди от група В* (виж по-долу) За да се предотвратят тежки щети на посева, **не използвайте** хербицид от група В*, който не е **Clearfield хербицид**, предназначен за различните сортове **Clearfield рапица**.

Самосевки на рапица Clearfield

- 1) Добра хигиена на полето След засяването на рапицата **Clearfield** е възможно на полето, а вероятно и в съседните полета, да се появят самосевки на рапица **Clearfield** в следствие на нормалните селскостопански дейности, но вероятно и чрез опрашване на съседната рапица. Спазвайте винаги добра хигиена на полето, особено:
 - при унищожаване на плевелите в рапицата
 - избягвайте механичното разпиляване на семената по полето чрез машини за сеитба или прибиране на реколта
 - стимулирайте и провокирайте покълването на самосевки от рапичните растения след ожънването, така че да е възможно тяхното унищожаване с хербициди или чрез механично обработване на почвата.
- 2) Унищожаване на самосевките за следващите култури За да унищожите самосевките на рапица **Clearfield**, използвайте или (а) подходящи хербициди, които не се числят към група В*, или (б) комбинация от подходящи хербициди, които не се числят към група В*, с такива от група В*. Използването на повече от един ефикасен хербицид е установена практика за намаляване на опасността от възникване на резистентни на хербициди плевели. Обърнете се към Вашия търговец/търговец на едро на хербициди за рапица **Clearfield** или към представител на BASF, за да намерите най-добрите възможности за прилагане на хербициди срещу самосевки на рапица **Clearfield**.

Условия за използване

Системата за производство на рапица **Clearfield** се доставя само въз основа на тези инструкции за употреба и стопанисване. С това се отхвърлят противоречиви препратки на потребителя, сочещи използването на неговите Общи условия.

Отговорност

Нито BASF SE, нито едно от дъщерните ѝ предприятия носят по никакъв начин отговорност спрямо потребителя за загуба или щети в следствие на използването или във връзка с

използването на (а) хербициди от група В, които не са хербициди на Clearfield за използване при рапичните сортове на Clearfield, или (б) поради неспазване на посочените по-горе инструкции. Във връзка с това BASF отхвърля изрично всякаква отговорност и потребителят заявява отказа си от поемането на такава.

* Хербицидите от група В, тоест инхибиторите ALS, са продукти, базиращи на следните химически групи
имидазолин, пиримидин, сулфонамиди, сулфонил карбамид, триазол пиримидин

Допълнителна информация за отделните хербицидни групи ще намерите на
<http://www.hracglobal.com/Publications/ClassificationofHerbicideSiteofAction.aspx>

* Допълнителна информация, включително и специални препоръки за унищожаване на самосевки на рапица **Clearfield** ще намерите на уебсайта www.clearfield.bg